

ホジキンリンパ腫

ABVD療法

4週毎 最大8回

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
ドキソルビシン ADM(DXR)	ドキソルビシン	25 mg/m ²	Day1,15
ブレオマイシン BLM	ブレオ	9 mg/m ²	Day1,15
ビンブラスチン VLB	エクザール	6 mg/m ²	Day1,15
ダカルバジン DTIC	ダカルバジン	375 mg/m ²	Day1,15

※) 15mgまで

※) 10mgまで

Day1, 15
Day2・3,
16・17
Day2~4,
16~18

イメンドカプセル(125) 1カプセル 抗がん剤投与1時間~1時間30分前に内服

イメンドカプセル(80) 1カプセル 朝食後内服

デカドロン錠(0.5mg) 16錠 朝昼食後内服

* デカドロン錠, デキサート注は使用しない場合がある。

Day1,15

生食 100ml / ルートキープ(外来のみ)

グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 1.5V / 15min

ドキソルビシン ()mg/body + 生理食塩液 20ml
/ 緩徐に5分かけて静注

ブレオマイシン ()mg/body + 生理食塩液 20ml
/ 緩徐に5分かけて静注

ビンブラスチン ()mg/body + 生理食塩液 20ml
/ 緩徐に静注

ダカルバジン ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 60min

* ダカルバジンは、点滴ボトルとラインを遮光

減量規定

ALT(GPT)、AST(GOT)が正常値の2~3倍

ALT(GPT)、AST(GOT)が正常値の3倍

3.1 < T-bil <= 5

5 < T-bil

75%用量

50%用量

25%用量

中止

末梢神経障害 G2 以上

中等度の運動神経障害

重症の運動神経障害

2/3用量

50%用量

中止

10 < Ccr <= 50mL/min

Ccr <= 10

75%用量

50%用量