

悪性リンパ腫

CEOP療法

3週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
エトポシド	ETP (VP-16)	エトポシド	50 mg/m ²	Day1 (div)
		ラステットS	100 mg/m ²	Day2,3 (p.o.)
シクロfosファミド	CPA	エンドキサン	750 mg/m ²	Day1
ビンクリスチン	VCR	オンコビン	1.4 mg/m ²	Day1
プレドニゾン	PSL	プレドニン	100 mg	Day1~5

(2mgまで)

※

Day1

グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

ビンクリスチン ()mg/body + 生理食塩液 20ml / 静注

エトポシド ()mg/body + 5%ブドウ糖液 250ml / 1hr

シクロfosファミド ()mg/body + 生理食塩液 500ml / 2hr

Day1~5

プレドニゾン錠(5mg) 20錠 2×朝昼食後

又は プレドニゾン(10mg) 10A + 生理食塩液 100ml / 30min

Day2,3

ラステットSカプセル(50mg) ()カプセル 1×朝食後

※ 70歳以上の高齢者の場合、PSL100mg×5日間の後、20mg/20mg/10mg/10mgと漸減します。

年齢による用量調整 (mg/m²)

	70歳以上	80歳以上
CPA	650	500
ETP(VP-16)	40(div) → 85(p.o.)	30(div) → 50(p.o.)
VCR	1.4 (max 2mg)	1 (max 1.5mg)
PSL	40	30