

非ホジキンリンパ腫

CEPP療法

4週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
シクロフォスファミド	CPA	エンドキサン	600 mg/m ²	Day1
エトポシド	VP-16	ラステット	100 mg/m ²	Day1～3
プロカルバジン	PCZ	塩酸プロカルバジン	50 mg	Day1～10
プレドニゾン	PSL	プレドニン	60 mg	Day1～10
			40 mg	Day11
			20 mg	Day12

Day1

シクロフォスファミド ()mg/body + 生理食塩液 500ml / 3hr

エトポシドカプセル ()mg/body 1×朝食後 内服

プロカルバジンカプセル(50mg) 1C 1×朝食後 内服

プレドニゾン錠(5mg) 12錠 2×朝昼食後 内服

Day2,3

エトポシドカプセル ()mg/body 1×朝食後 内服

プロカルバジンカプセル(50mg) 1C 1×朝食後 内服

プレドニゾン錠(5mg) 12錠 2×朝昼食後 内服

Day4～10

プロカルバジンカプセル(50mg) 1C 1×朝食後 内服

プレドニゾン錠(5mg) 12錠 2×朝昼食後 内服

Day11

プレドニゾン錠(5mg) 8錠 2×朝昼食後 内服

Day11,12

プレドニゾン錠(5mg) 4錠 2×朝昼食後 内服