

悪性リンパ腫

CHOP療法

3週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日	
シクロfosファミド	CPA	エンドキサン	750 mg/m ²	Day1
ドキシソルビシン	ADM	ドキシソルビシン	50 mg/m ²	Day1
ビンクリスチン	VCR	オンコビン	1.4 mg/m ²	Day1
プレドニゾン	PSL	プレドニン	100 mg	Day1~5

(2mgまで)
※1)

Day1

グラニセトンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

ドキシソルビシン ()mg/body + 生理食塩液 20ml / 静注
又は ドキシソルビシン ()mg/body + 生理食塩液 100ml / 30min ※2)

ビンクリスチン ()mg/body + 生理食塩液 20ml / 静注
又は ビンクリスチン ()mg/body + 生理食塩液 50ml / 15min ※2)

シクロfosファミド ()mg/body + 生理食塩液 500ml / 2hr

プレドニゾン(10mg) 10A + 生理食塩液 100ml / 30min
又は プレドニゾン錠(5mg) 20錠 2×朝昼食後

Day2~5

プレドニゾン(10mg) 10A + 生理食塩液 100ml / 30min
又は プレドニゾン錠(5mg) 20錠 2×朝昼食後

※1) 70歳以上の高齢者の場合、PSL100mg×5日間の後、20mg/20mg/10mg/10mgと漸減します。

※2) CVルートから投与する場合