

# 非ホジキンリンパ腫

## DA-EPOCH-R療法

3週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
リツキシマブ		リツキサソ	375 mg/m <sup>2</sup>	Day1
ドキシソルビシン	DXR	ドキシソルビシン	10 mg/m <sup>2</sup>	Day1-4
エトポシド	VP-16	エトポシド	50 mg/m <sup>2</sup>	Day1-4
ビンクリスチン	VCR	オンコピン	0.4 mg/m <sup>2</sup>	Day1-4
シクロフォスファミド	CPA	エンドキサソ	750 mg/m <sup>2</sup>	Day5
プレドニゾロン	PSL	プレドニン	60 mg/m <sup>2</sup>	Day1-5

Day1

カロナール(200) 3錠 , ネオマレルミンTR(6) 1錠  
/ 1×リツキシマブ投与30分前 内服

ソル・コーテフ(100mg) 1V + 生理食塩液 100ml  
/ 30min 医師の指示により投与開始

リツキシマブ ( )mg/body + 生理食塩液 1000ml ※  
※ リツキシマブ600mg以下の場合は生理食塩液500mlを使用

グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

プレドニゾロン ( )mg/body + 生理食塩液 100ml / 30min

ドキシソルビシン ( )mg/body + エトポシド ( )mg/body  
+ ビンクリスチン ( )mg/body + 生理食塩液 20ml(溶解用)  
+ 生理食塩液 500ml / 24hr

Day2-4

グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

プレドニゾロン ( )mg/body + 生理食塩液 100ml / 30min

ドキシソルビシン ( )mg/body + エトポシド ( )mg/body  
+ ビンクリスチン ( )mg/body + 生理食塩液 20ml(溶解用)  
+ 生理食塩液 500ml / 24hr



Day5

グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

プレドニゾロン ( )mg/body + 生理食塩液 100ml / 30min

シクロフォスファミド ( )mg/body + 生理食塩液 500ml / 2hr

※ リツキシマブは生理食塩液(又は5%ブドウ糖液)で10倍に希釈して使用するため、輸液の量は多少増減します。標準的注入速度は以下の通りです。



### 2コース目以降の用量

用量レベル	DXR	VP-16	CPA	(単位 mg/m <sup>2</sup> )
6	24.8	124.4	1866	
5	20.7	103.7	1555	
4	17.3	86.4	1296	
3	14.4	72	1080	
2	12	60	900	
1(初回)	10	50	750	
-1	10	50	600	
-2	10	50	480	

前コースの好中球数の最低値 $\geq 500/\mu\text{L}$ : 用量レベルを1あげる  
 前コースの好中球数の最低値 $< 500/\mu\text{L}$ : 前コースと同じ用量レベル  
 前コースの血小板数の最低値 $< 25000/\mu\text{L}$ : 用量レベルを1さげる