

# 悪性リンパ腫

## G-CHOP療法(初回)

3週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
オビヌツツマブ		ガザイバ	1000 mg/body	Day1,8,15
シクロフォスファミド	CPA	エンドキサン	750 mg/m <sup>2</sup>	Day2
ドキシソルビシン	DXR	ドキシソルビシン	50 mg/m <sup>2</sup>	Day2
ビンクリスチン	VCR	オンコピン	1.4 mg/m <sup>2</sup>	Day2
プレドニゾン	PSL	プレドニン	100 mg/body	Day1~5

※2mgまで

### Day1

カロナール(200) 3錠 , ネオマレルミンTR(6) 1錠  
 / 1×ガザイバ投与60分前 内服  
 生理食塩液 50ml /全開(フラッシュ)

ガザイバ (1000)mg/body + 生理食塩液 250ml ※

※最終液量を250mlとする。

※12.5ml/hで投与開始。状態を確認しながら、30min毎に12.5ml/h ずつ増量可。

最大100ml/hまで

※0.2又は0.22 μ mのインラインフィルターを使用すること

プレドニゾン錠(5mg) 20錠 2×朝昼食後

### Day2

グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 15min

ドキシソルビシン ( )mg/body + 生理食塩液 20ml / 静注

ビンクリスチン ( )mg/body + 生理食塩液 20ml / 静注

シクロフォスファミド ( )mg/body + 生理食塩液 500ml / 2hr

プレドニゾン錠(5mg) 20錠 2×朝昼食後

### Day8,15

ソル・メドロール(125mg) 1V + 生理食塩液 100ml  
 / 30min ガザイバ投与90分前  
 生理食塩液 50ml /全開(フラッシュ)

カロナール(200) 3錠 , ネオマレルミンTR(6) 1錠  
 / 1×ガザイバ投与60分前 内服

ガザイバ (1000)mg/body + 生理食塩液 250ml ※

※最終液量を250mlとする。

※25ml/hで投与開始。状態を確認しながら、30min毎に25ml/h ずつ増量可。

最大100ml/hまで(前回投与でGrade2以上の副作用が無かった場合のみ)

※0.2又は0.22 μ mのインラインフィルターを使用すること

### Day3~5

プレドニゾン錠(5mg) 20錠 2×朝昼食後