

# 悪性リンパ腫

## GDP療法

3週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
ゲムシタビン	GEM	ゲムシタビン	1000 mg/m <sup>2</sup>	Day 1, 8
シスプラチン	CDDP	シスプラチン	75 mg/m <sup>2</sup>	Day 1
デキサメタゾン	DEX	デカドロン錠 デキサート注	40 mg/body	Day 1~4

### Day 1

イメンドカプセル(125) 1カプセル 抗がん剤投与1時間~1時間30分前に内服

ソルデム1 500mL / ルートキープ

グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 6V / 60min

ゲムシタビン ( )mg/body + 生理食塩液 100ml / 30min

ソルデム3A 500ml + 硫酸マグネシウム補正液(20mEq/20ml) 1A / 60min

20%マンニトール 300ml / 30min

シスプラチン( )mg/body + 生理食塩液 300ml / 120min

生理食塩液 500ml / 60min

Day2,3 | イメンドカプセル(80) 1カプセル 朝食後内服

day2-4 | デカドロン錠(4mg) 10錠 朝昼食後 内服

または

デキサート(6.6mg/2ml) 6V + 生理食塩液 50ml / 60min

### Day 8

デキサート(6.6mg/2ml) 1V + 生理食塩液 50ml / 15min

ゲムシタビン ( )mg/body + 生理食塩液 100ml / 30min