

多発性骨髄腫(未治療・再発)2コース目以降

Kd療法

4週毎

薬剤・略号等	商品名	投与量	投与日
カルフィルゾミブ	カイプロリス	56 mg/m ²	Day1,2,8,9,15,16
デキサメタゾン	DEX	20 mg	Day1,2,8,9,15,16,22,23

DAY 1,2,8,9,15,16

生理食塩液 100ml / ルートキープ(外来のみ)

デキサート(6.6mg/2ml) 3V+生理食塩液 50ml/ 60min

生理食塩液 50ml / カイプロリス投与前、全開フラッシュ

カルフィルゾミブ ()mg/body+注射用水+5%ブドウ糖 50ml /30min ※1、2

生理食塩液 50ml / 全開フラッシュ

※1: 体表面積が2.2m²を超える患者では、体表面積を2.2m²として、投与量を算出すること

※2: 空容量確保のため、5%ブドウ糖100mlから、50ml抜いて使用

DAY 22,23

デキサメタゾン20mg/body /P.O

調製方法

10mg製剤: 注水5ml/Vで溶解後必要量を採取し、5%ブドウ糖液で希釈

40mg製剤: 注水20ml/Vで溶解後必要量を採取し、5%ブドウ糖液で希釈