

多発性骨髄腫(未治療・再発)初回

KRd療法

4週毎

薬剤・略号等	商品名	投与量	投与日
カルフィルゾミブ	カイプロリス	20 mg/m ²	Day1,2
カルフィルゾミブ	カイプロリス	27 mg/m ²	Day8,9,15,16
レナリドミド	レブラミド	25 mg	Day1~21
デキサメタゾン	DEX	40 mg	Day1,8,15,22 (Day22は、内服)

DAY 1,8,15

生理食塩液 100ml /ルートキープ(外来のみ)

デキサート(6.6mg/2ml) 6V+生理食塩液 50ml/ 60min

生理食塩液 50ml /カイプロリス投与前 全開フラッシュ

カルフィルゾミブ ()mg/body+注射用水+ 5%ブドウ糖 50ml /10min ※1, 2

生理食塩液 50ml / 全開フラッシュ

※1: 体表面積が2.2m²を超える患者では、体表面積を2.2m²として、投与量を算出すること
 ※2: 空容量確保のため、5%ブドウ糖100mlから、50ml抜いて使用

DAY 2,9,16

生理食塩液 100ml /ルートキープ(外来のみ)

生理食塩液 50ml /カイプロリス投与前、フラッシュ(入院のみ)

カルフィルゾミブ ()mg/body+注射用水+ 5%ブドウ糖 50ml /10min ※1, 2

生理食塩液 50ml / 全開フラッシュ

※1: 体表面積が2.2m²を超える患者では、体表面積を2.2m²として、投与量を算出すること
 ※2: 空容量確保のため、5%ブドウ糖100mlから、50ml抜いて使用

DAY 22

デキサメタゾン40mg/body /P.O

調製方法

10mg製剤: 注水5ml/Vで溶解後必要量を採取し、5%ブドウ糖液で希釈

40mg製剤: 注水20ml/Vで溶解後必要量を採取し、5%ブドウ糖液で希釈