

悪性リンパ腫

R-CEOP療法

3週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日	
リツキシマブ	R	リツキサン	375 mg/m ²	Day1	
エトポシド	ETP (VP-16)	エトポシド	50 mg/m ²	Day2 (div)	
		ラステットS	100 mg/m ²	Day2,3 (p.o.)	
シクロフォスファミド	CPA	エンドキサン	750 mg/m ²	Day2	
ビンクリスチン	VCR	オンコビン	1.4 mg/m ²	Day2	(2mgまで)
プレドニゾロン	PSL	プレドニン	100 mg	Day2~6	※1)

Day1

カロナール(200) 3錠 , ネオマレルミンTR(6) 1錠
/ 1×リツキシマブ投与30分前 内服

ソル・コーテフ(100mg) 1V + 生理食塩液 100ml
/ 30min 医師の指示により投与開始

リツキシマブ ()mg/body + 生理食塩液 1000ml ※2)

※ リツキシマブ600mg以下の場合は生理食塩液500mlを使用

Day2

グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

ビンクリスチン ()mg/body + 生理食塩液 20ml / 静注

エトポシド ()mg/body + 5%ブドウ糖液 250ml / 1hr

シクロフォスファミド ()mg/body + 生理食塩液 500ml / 2hr

Day2~6

プレドニゾロン錠(5mg) 20錠 2×朝昼食後

又は プレドニゾロン(10mg) 10A + 生理食塩液 100ml / 30min

Day2,3

ラステットSカプセル(50mg) ()カプセル 1×朝食後

年齢による用量調整 (mg/m²)

	70歳以上	80歳以上
CPA	650	500
ETP (VP-16)	40(div) → 85(p.o.)	30(div) → 50(p.o.)
VCR	1.4 (max 2mg)	1 (max 1.5mg)
PSL	40	30

- ※1) 70歳以上の高齢者の場合、PSL100mg×5日間の後、20mg/20mg/10mg/10mgと漸減します。
- ※2) リツキシマブは生理食塩液(又は5%ブドウ糖液)で10倍に希釈して使用するため、輸液の量は多少増減します。標準的注入速度は以下の通りです。

