

悪性リンパ腫

GDP療法

3週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
リツキシマブ	R	リツキサン	375mg/m ²	Day1
ゲムシタビン	GEM	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	Day 2, 9
シスプラチン	CDDP	シスプラチン	75 mg/m ²	Day 2
デキサメタゾン	DEX	デカドロン錠 デキサート注	40 mg/body	Day 1~4

Day1

カロナール(200) 3錠 , ネオマレルミンTR(6) 1錠
/ 1×リツキシマブ投与30分前 内服

ソル・コーテフ(100mg) 1V + 生理食塩液 100ml
/ 30min 医師の指示により投与開始

リツキシマブ ()mg/body + 生理食塩液 1000ml ※

※ リツキシマブ600mg以下の場合は生理食塩液500mlを使用

Day2

イメンドカプセル(125) 1カプセル 抗がん剤投与1時間~1時間30分前に内服

ソルデム1 500mL / ルートキープ

グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 6V / 60min

ゲムシタビン ()mg/body + 生理食塩液 100ml / 30min

ソルデム3A 500ml + 硫酸マグネシウム補正液(20mEq/20ml) 1A / 60min

20%マンニトール 300ml / 30min

シスプラチン()mg/body + 生理食塩液 300ml / 120min

生理食塩液 500ml / 60min

Day2,3 | イメンドカプセル(80) 1カプセル 朝食後内服

day2-4 | デカドロン錠(4mg) 10錠 朝昼食後 内服

または

デキサート(6.6mg/2ml) 6V + 生理食塩液 50ml / 60min

Day 9

デキサート(6.6mg/2ml) 1V + 生理食塩液 50ml / 15min

ゲムシタビン ()mg/body + **生理食塩液 100ml / 30min**

※ 70歳以上の高齢者の場合、PSL100mg×5日間の後、20mg/20mg/10mg/10mgと漸減します。
※ リツキシマブは生理食塩液(又は5%ブドウ糖液)で10倍に希釈して使用するため、輸液の量は多少増減します。標準的注入速度は以下の通りです。

