

急性リンパ性白血病, 悪性リンパ腫

R-大量MTX+AraC療法

3週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
リツキシマブ		リツキサソ	375 mg/m ²	Day1
メトトレキサート	MTX	メトトレキサート	200 mg/m ²	Day2
			800 mg/m ²	Day2 (持続)
メチルプレドニゾン	mPSL	ソル・メルコート	50 mg/body	Day2~4
シタラビン	Ara-C	キロサイド	3000 ^{※1} mg/m ² × 2	Day3~4

Day1

カロナール(200) 3錠 , ネオマレルミンTR(6) 1錠
/ 1×リツキシマブ投与30分前 内服

ソル・コーテフ(100mg) 1V + 生理食塩液 100ml
/ 30min 医師の指示により投与開始

リツキシマブ ()mg/body + 生理食塩液 1000ml ^{※2}

※ リツキシマブ600mg以下の場合は生理食塩液500mlを使用

Day2

ソル・メルコート(125mg) 0.4V + 生理食塩液 50ml / 15min (12時間毎)

グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

メトトレキサート ()mg/body + 5%ブドウ糖液 100ml / 2hr

メトトレキサート ()mg/body + 5%ブドウ糖液 500ml / 22hr持続

ソル・メルコート(125mg) 0.4V + 生理食塩液 50ml / 15min (12時間毎)

グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

Day3~4

ソル・メルコート(125mg) 0.4V + 生理食塩液 50ml / 15min (12時間毎)

グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

シタラビン ()mg/body + 生理食塩液 300ml / 3hr (12時間毎)

ソル・メルコート(125mg) 0.4V + 生理食塩液 50ml / 15min (12時間毎)

グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

シタラビン ()mg/body + 生理食塩液 300ml / 3hr (12時間毎)

ロイコボリン15mg / 静注

2/2

MTX投与開始36時間後より6時間毎に最低8回投与

MTX血中濃度 0.1 μ mol/L以下で投与終了

MTX投与終了時血中濃度 >20 μ mol/Lの場合は50mg/回に増量

MTX投与終了6時間後血中濃度 >10 μ mol/Lの場合は50mg/回に増量

MTX投与終了48時間後血中濃度 >0.1 μ mol/Lの場合は50mg/回に増量

Day 2よりイメンド内服を開始

尿のpH>7.0を保つようにメイロンを点滴内に混注

利尿剤はダイアモックスを使用

※1 シタラビン:60歳以上は1000mg/m²×2

※2 リツキシマブは生理食塩液(又は5%ブドウ糖液)で10倍に希釈して使用するため、輸液の量は多少増減します。標準的注入速度は以下の通りです。

