

悪性リンパ腫

THP-COP療法

3週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
シクロfosファミド	CPA	エンドキサソ	750 mg/m ² Day1
ピラルビシン	THP-DXR	テラルビシン	50 mg/m ² Day1
ビンクリスチン	VCR	オンコビン	1.4 mg/m ² Day1
プレドニゾン	PSL	プレドニン	100 mg Day1~5

(2mgまで)

Day1

グラニセトンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

ビンクリスチン ()mg/body + 生理食塩液 20ml / 静注
 又は ビンクリスチン ()mg/body + 生理食塩液 50ml / 15min ※)

ピラルビシン ()mg/body + 生理食塩液 100ml / 30min

シクロfosファミド ()mg/body + 生理食塩液 500ml / 2hr

プレドニゾン(10mg) 10A + 生理食塩液 100ml / 30min
 又は プレドニゾン錠(5mg) 20錠 2×朝昼食後

Day2~5

プレドニゾン(10mg) 10A + 生理食塩液 100ml / 30min
 又は プレドニゾン錠(5mg) 20錠 2×朝昼食後

※)CVルートから投与する場合

年齢による用量調整(mg/m²)

	70歳以上	80歳以上
CPA	650	500
THP-DXR	40	30
VCR	1.4 (max 2mg)	1 (max 1mg)
PSL	40	30