

マントル細胞リンパ腫

VR-CAP療法

3週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日	
リツキシマブ		リツキサン	375 mg/m ²	Day1	(8回まで)
シクロフォスファミド	CPA	エンドキサン	750 mg/m ²	Day2	
ドキシソルビシン	ADM	ドキシソルビシン	50 mg/m ²	Day2	
ボルテゾミブ		ベルケイド	1.3 mg/m ²	Day2,5,9,12	
プレドニゾロン	PSL	プレドニン	100 mg	Day2~6	※1

Day1

カロナール(200) 3錠 , ネオマレルミンTR(6) 1錠
/ 1×リツキシマブ投与30分前 内服

ソル・コーテフ(100mg) 1V + 生理食塩液 100ml
/ 30min 医師の指示により投与開始

リツキシマブ ()mg/body + 生理食塩液 1000ml ※2
リツキシマブ600mg以下の場合には生理食塩液500mlを使用

Day2

グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

ドキシソルビシン ()mg/body + 生理食塩液 20ml / 静注

ボルテゾミブ ()mg/body + 生理食塩液 ()ml / 静注 または 皮下注 ※3

シクロフォスファミド ()mg/body + 生理食塩液 500ml / 2hr

プレドニゾロン(10mg) 10A + 生理食塩液 100ml / 30min
又は プレドニゾロン錠(5mg) 20錠 2×朝昼食後

Day3,4

プレドニゾロン(10mg) 10A + 生理食塩液 100ml / 30min
又は プレドニゾロン錠(5mg) 20錠 2×朝昼食後

Day5

ボルテゾミブ ()mg/body + 生理食塩液 ()ml / 静注 または 皮下注 ※3

プレドニゾロン(10mg) 10A + 生理食塩液 100ml / 30min
又は プレドニゾロン錠(5mg) 20錠 2×朝昼食後

Day6

プレドニゾロン(10mg) 10A + 生理食塩液 100ml / 30min
又は プレドニゾロン錠(5mg) 20錠 2×朝昼食後

Day9,12

ボルテゾミブ ()mg/body + 生理食塩液 ()ml / 静注 または 皮下注 ※3

※1 70歳以上の高齢者の場合、PSL100mg×5日間の後、20mg/20mg/10mg/10mgと漸減します。

※2 リツキシマブは生理食塩液(又は5%ブドウ糖液)で10倍に希釈して使用するため、輸液の量は多少増減します。標準的注入速度は以下の通りです。

※3 ボルテゾミブ(ベルケイド)の調製方法
1Vを静注の場合は3ml、皮下注の場合は1.2mlで溶解し必要量を採用する。

リツキシマブの標準的注入速度

