

ホジキンリンパ腫・未分化大細胞リンパ腫

ブレンツキシマブ(アドセトリス)療法

3週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
ブレンツキシマブ	アドセトリス	1.8 mg/kg	Day1

Day1

生理食塩液 100ml / ルートキープ

ブレンツキシマブ ()mg/body
+ 注射用水 100ml + 生理食塩液 100ml / 30min

※1 ブレンツキシマブ(アドセトリス)の溶解方法

1 バイアル(50mg)あたり注射用水10.5mlを加え溶解し、5mg/mlの溶解液とする。

※2 最終濃度が0.4~1.2mg/mlになるよう、用量が162mg以上の場合は生食を250mlに、
用量が42mg以下の場合は生食を50mlへ変更する。

【休薬・減量・中止基準】

末梢神経障害

Grade	処置
Grade1 機能障害はなく、知覚障害、反射消失のみ	同一用法・用量で、投与を継続する
Grade2 機能障害はあるが、日常生活に支障はない	ベースライン又はGrade1以下に回復するまで休薬する。回復した場合は、1.2mg/kgに減量して投与を再開する。
Grade3 日常生活に支障がある	
Grade4 障害をきたす感覚ニューロパチー、生命を脅かす又は麻痺をきたす運動ニューロパチー	投与中止する。

好中球減少症

Grade	処置
Grade1 1,500/mm ³ 以上 基準値下限未満	同一用法・用量で、投与を継続する
Grade2 1,000/mm ³ 以上 1,500/mm ³ 未満	
Grade3 500/mm ³ 以上 1,000/mm ³ 未満	ベースライン又はGrade2以下に回復するまで休薬する。回復後は、同一用法・同一用量で投与を再開する。
Grade4 500/mm ³ 未満	