

急性リンパ性白血病, 悪性リンパ腫

大量MTX+AraC療法

3週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
メトトレキサート	MTX	メトトレキサート	200 mg/m ²
			800 mg/m ²
メチルプレドニゾン	mPSL	ソル・メルコート	50 mg/body
シタラビン	Ara-C	キロサイド	3000 [※] mg/m ² × 2

※60歳以上は1000mg/m²

Day1

ソル・メルコート(125mg) 0.4V + 生理食塩液 50ml / 15min (12時間毎)

グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

メトトレキサート ()mg/body + 5%ブドウ糖液 100ml / 2hr

メトトレキサート ()mg/body + 5%ブドウ糖液 500ml / 22hr持続

ソル・メルコート(125mg) 0.4V + 生理食塩液 50ml / 15min (12時間毎)

グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

Day2~3

ソル・メルコート(125mg) 0.4V + 生理食塩液 50ml / 15min (12時間毎)

グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

シタラビン ()mg/body + 生理食塩液 300ml / 3hr (12時間毎)

ソル・メルコート(125mg) 0.4V + 生理食塩液 50ml / 15min (12時間毎)

グラニセロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

シタラビン ()mg/body + 生理食塩液 300ml / 3hr (12時間毎)

ロイコボリン15mg / 静注

MTX投与開始36時間後より6時間毎に最低8回投与

MTX血中濃度 0.1μmol/L以下で投与終了

MTX投与終了時血中濃度 >20μmol/Lの場合は50mg/回に増量

MTX投与終了6時間後血中濃度 >10μmol/Lの場合は50mg/回に増量

MTX投与終了48時間後血中濃度 >0.1μmol/Lの場合は50mg/回に増量

Day 2よりイメンド内服を開始

尿のpH>7.0を保つようにメイロンを点滴内に混注

利尿剤はダイアモックスを使用