

ホジキンリンパ腫

A+AVD療法

4週毎 最大6クール

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
ブレンツキシマブ	アドセトリス	1.2 mg/kg	Day1,15
ドキシソルビシン	ADM(DXR)	ドキシソルビシン	25 mg/m ² Day1,15
ビンブラスチン	VLB	エクザール	6 mg/m ² Day1,15
ダカルバジン	DTIC	ダカルバジン	375 mg/m ² Day1,15

※) 10mgまで

Day1,15

- ① 生食 100ml / ルートキープ(外来のみ)
- ② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 15min
- Y ③ ドキシソルビシン ()mg/body + 生理食塩液 20ml
/ 緩徐に5分かけて静注
- Y ④ ビンブラスチン ()mg/body + 生理食塩液 20ml
- S ⑤ 生理食塩液 100ml / シングルルート プライミング用
- S ⑥ ダカルバジン ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 60min
* ダカルバジンは、点滴ボトルとラインを遮光
- Y ⑦ 生食50ml / 全開フラッシュ
* バックアダプタを使用
- Y ⑧ ブレンツキシマブ ()mg/body ※1, 2
+注射用水 100ml + 生理食塩液 100ml / 30min

※1 1バイアル(50mg)あたり注射用水10.5mlを加え溶解し、5mg/mlの溶解液とする。

※2 最終濃度が0.4~1.2mg/mlになるよう、用量が162mg以上の場合は生食を250mlに、用量が42mg以下の場合は生食を50mlへ変更する。

【減量規定】

ALT(GPT)、AST(GOT)が正常値の2~3倍	ドキシソルビシン	75%用量
ALT(GPT)、AST(GOT)が正常値の3倍		50%用量
3.1 < T-bil ≤ 5		25%用量
5 < T-bil		中止

末梢神経障害 G2 以上	エクザール	2/3用量
中等度の運動神経障害		50%用量
重症の運動神経障害		中止

末梢神経障害 G2	アドセトリス	0.9mg/kgに減量
末梢神経障害 G3		G2以下まで休薬、0.9mg/kgに減量
末梢神経障害 G4		投与を中止する。

好中球数 1000mm ³ 以上	アドセトリス	同一用法・用量で、投与を継続
好中球数 1000mm ³ 未満		ベースライン又は1000mm ³ 以上に回復するまで休薬