

急性リンパ性白血病

AdVP療法

4週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日	
ドキシソルビン	ADM	ドキシソルビン	20 mg/m ²	Day1~3
ビンクリスチン	VCR	オンコビン	1.4 mg/m ²	Day1、8、15、22
プレドニゾロン	PSL	プレドニン	40 mg/m ²	Day1~28

MAX: 2mg

Day1

生食100ml/ルートキープ(外来のみ)

グラニセトンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

ドキシソルビン ()mg/body + 生理食塩液 20ml / 静注

ビンクリスチン ()mg/body + 生理食塩液 20ml / 静注

Day2

生食100ml/ルートキープ(外来のみ)

グラニセトンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

ドキシソルビン ()mg/body + 生理食塩液 20ml / 静注

Day3

生食100ml/ルートキープ(外来のみ)

グラニセトンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

ドキシソルビン ()mg/body + 生理食塩液 20ml / 静注

Day8、15、22

生食100ml/ルートキープ(外来のみ)

ビンクリスチン ()mg/body + 生理食塩液 20ml / 静注

DAY 1~28

プレドニゾロン()mg/body /P.O