

悪性リンパ腫

BR療法(2日間)

4週毎(最大6回)

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
リツキシマブ	リツキサン	375 mg/m ²	Day1
ベンダムスチン	トレアキシシ	90 mg/m ²	Day1,2

Day1 | イメンドカプセル(125) 1カプセル 抗がん剤投与1時間～1時間30分前に内服

Day2,3 | イメンドカプセル(80) 1カプセル 朝食後内服

Day1

カロナール(200) 3錠 , ネオマレルミンTR(6) 1錠
/ 1×リツキシマブ投与30分前 内服

生理食塩液 100ml / ルートキープ(外来のみ)

グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 1V /30min

ベンダムスチン ()mg/body + 注射用水 + 生理食塩液 250ml / 1hr

生理食塩液 50ml /全開(フラッシュ)

リツキシマブ ()mg/body + 生理食塩液 1000ml ※

※ リツキシマブ600mg以下の場合は生理食塩液500mlを使用

Day2

生理食塩液 100ml / ルートキープ(外来のみ)

グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 1V /30min

ベンダムスチン ()mg/body + 注射用水 + 生理食塩液 250ml / 1hr

ベンダムスチンの調製方法

1V100mgは注射用水40mL, 1V25mgは注射用水10mLで溶解する。

調製後、3時間以内に投与を終了すること！

※リツキシマブは生理食塩液(又は5%ブドウ糖液)で10倍に希釈して使用するため、輸液の量は多少増減します。標準的注入速度は以下の通りです。

