

多発性骨髄腫

IsaPd療法

4週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
サークリサ	イサツキシマブ	10 mg/kg	Day1,8,15,22(1サイクル目) Day1,15(2サイクル目以降)
ポマリスト	ポマリドミド	4mg(適宜減量)	Day1-21
レナデックス	デキサメタゾン	40mg(75歳未満) 20mg(75歳以上)	Day1,8,15,22

Day1,8,15,22

内服 レナデックス(4mg) 10錠 又は 5錠 / 1×イサツキシマブ(サークリサ)投与 1時間前

カロナール(500) 2錠 , ネオマレルミンTR(6) 1錠 ,
ファモチジン(20) 1錠 / 1×イサツキシマブ(サークリサ)投与 30分前

点滴 生理食塩液100ml /ルートキープ用

点滴

イサツキシマブ(サークリサ) ()mg/kg + 生理食塩液 250 ml ※
--

最終液量を250mlとする。

0.2又は0.22 μmのインラインフィルターを使用すること

※ 投与速度は以下の通り

投与時期	投与速度(mg/時)		
	初回	2回目以降	
投与開始	0~60分	175	175
	60~90分	225	275
	90~120分	275	375
	120~150分	325	400
	150~180分	375	400
	180分以降	400	400