

再発又は難治性の多発性骨髄腫

ダラキューロ+Bd療法(2~3コース目)

1コース 3週

※BOR(SC)

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
ダラツムマブ・ホルヒアルロニダーゼ		ダラキューロ	1800 mg/15ml	d1,8,15
ボルテゾミブ	BOR	ベルケイド	1.3 mg/m ²	d1,4,8,11
デキサメタゾン	DEX	レナデックス	20 mg	d1,2,4,5,8,9,11,12,15 ※1

80mg/w 80mg/w

※1 次に該当する場合は、DBd療法としてのDEXを20mg/wに減量することができる。
75歳を超える・BMI18.5kg/m²未満・DM・ステロイドに対する不耐性あり。

Day1,8	<p>内服 レナデックス錠4mg 5錠 カロナール錠500mg 2錠 クロルフェニラミンTR錠6mg 1錠 /投与1時間前 内服</p> <p>皮下注 ボルテゾミブ ()mg/m² + 生理食塩液20ml / 皮下注 ※1バイアルを生理食塩液1.2mlで溶解し、必要量を採取する。</p> <p>皮下注 ダラキューロ 1800mg/body / 皮下注 ※調製後室温で4時間まで保存可能 ※臍から7.5cmの位置に3~5分かけて皮下投与(PVC製翼状針使用可) ※20mlシリンジを用いて15mlを採取し、23G針を付けて払い出し</p>
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

day4,11	<p>皮下注 ボルテゾミブ ()mg/m² + 生理食塩液20ml / 皮下注 ※1バイアルを生理食塩液1.2mlで溶解し、必要量を採取する。</p>
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Day15	<p>内服 レナデックス錠4mg 5錠 カロナール錠500mg 2錠 クロルフェニラミンTR錠6mg 1錠 /投与1時間前 内服</p> <p>皮下注 ダラキューロ 1800mg/body / 皮下注 ※調製後室温で4時間まで保存可能 ※臍から7.5cmの位置に3~5分かけて皮下投与(PVC製翼状針使用可) ※20mlシリンジを用いて15mlを採取し、23G針を付けて払い出し</p>
-------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------