

# 再発又は難治性の多発性骨髄腫

## ダラキューロ+Bd療法(4~8コース目)

1コース 3週

※BOR(SC)

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日	
ダラツムマブ・ホルヒアルロニダーゼ*	ダラキューロ	1800 mg/15ml	d1	
ボルテゾミブ	BOR	ベルケイド	1.3 mg/m <sup>2</sup>	d1,4,8,11
デキサメタゾン	DEX	レナデックス	20 mg	d1,2,4,5,8,9,11,12 ※1

80mg/w 80mg/w

※1 次に該当する場合は、DBd療法としてのDEXを20mg/wに減量することができる。  
75歳を超える・BMI18.5kg/m<sup>2</sup>未満・DM・ステロイドに対する不耐性あり。

Day1	<p><b>内服</b> レナデックス錠4mg 5錠 カロナール錠500mg 2錠 クロルフェニラミンTR錠6mg 1錠 /投与1時間前 内服</p> <p><b>皮下注</b> ボルテゾミブ ( )mg/m<sup>2</sup> + 生理食塩液20ml / 皮下注 ※1バイアルを生理食塩液1.2mlで溶解し、必要量を採取する。</p> <p><b>皮下注</b> ダラキューロ 1800mg/body / 皮下注 ※調製後室温で4時間まで保存可能 ※臍から7.5cmの位置に3~5分かけて皮下投与(PVC製翼状針使用可) ※20mlシリンジを用いて15mlを採取し、23G針を付けて払い出し</p>
------	--

day4,8,11	<p><b>皮下注</b> ボルテゾミブ ( )mg/m<sup>2</sup> + 生理食塩液20ml / 皮下注 ※1バイアルを生理食塩液1.2mlで溶解し、必要量を採取する。</p>
-----------	--