

卵巣がん

TC(パクリタキセル・カルボプラチン)+ベバシズマブ 療法 3~4週毎

薬剤・略号等		商品名	投与量	投与日
パクリタキセル	PTX	パクリタキセル	175 mg/m ²	Day1
カルボプラチン	CBDCA	カルボプラチン	AUC=5	Day1
ベバシズマブ		アバスチン	15mg/kg	Day1

身長	体重	体表面積	Ccr	ml/min
cm	kg	m ²	(Cr	mg/dl)

- Day 1
- (/)
- ① 生理食塩液 100ml / ルートキープ Div
 - ② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P +デキサート(6.6mg/2ml) 2.5V
+ ポララミン(5mg/1ml) 1A + ファモチジン(20mg/20ml) 1A 30分でDiv
 - Y ③ パクリタキセル()mg/body + 生食500ml 180分でDiv
インラインフィルター付ルート使用
滴下速度は1.5~1.8倍で設定し、随時確認して調節
 - Y ④ カルボプラチン()mg/body + 生食500ml 90分でDiv
 - Y ⑤ 生理食塩液 50ml / 全開(フラッシュ)
Y字から投与, バックアダプタ使用
 - Y ⑥ ベバシズマブ()mg/body + 生食100ml ※
初回は90分で行い、以後特に問題がなければ、2回目は60分、
3回目以降は30分で投与。
 - ⑦ 生食 100ml / フラッシュ
- Day2, 3 デキサメタゾン(0.5mg) 16錠 朝食後内服