

関節リウマチ

レミケード療法

2回目 2週後

検査値チェック不要

3回目 初回から6週後

以降 8週毎 ※1

薬剤	商品名	投与量	投与日
インフリキシマブ	レミケード	3mg/kg ※2	Day1

Day1

生理食塩液 100ml / ルートキープ

インフリキシマブ ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 2hr以上 ※3

1.2 μ m以下のインラインフィルター付ルートを使用

- ※1 初回から6週後(3回目)の投与後、効果不十分又は効果が減弱した場合、増量や投与期間の短縮が可能。なお、最短の投与間隔は4週とする。
- ※2 初回から6週後(3回目)の投与後、8週間隔であれば1回の投与量を10mg/kgまで増量できる。投与期間を短縮した場合の投与量の上限は6mg/kg。
- ※3 インフリキシマブの点滴速度は以下の通り

開始 0~15分	20ml/hr
15~30分	40ml/hr
30~45分	60ml/hr
45~60分	80ml/hr
60分~	100ml/hr

調製方法

- 1) 21Gの注射針を用いて、1バイアルあたり生理食塩液10mlを、静かに注入する。
- 2) バイアルを回転させながら緩やかに溶解し、溶解後は5分間静置する。
- 3) 必要量をバイアルから抜き取り、約250mlの生理食塩液に希釈する。