

非小細胞肺癌に対する

カルボプラチン + ゲムシタビン併用療法

CBDCA+GEM

コース目

カルボプラチン(CBDCA)	AUC 4~ <u>5</u> (Day1)	
ゲムシタビン(GEM)	<u>800</u> ~1000mg/m ² (Day1,8)	3~4週毎

身長	体重	体表面積	Cr
cm	kg	m ²	mg/dl (Ccr ml/min)

Ccr(Cockcroft-Gault) = 体重(kg) x (140-年齢) / 72x Cr(mg/dl)
 女性は0.85倍 Cr(日本での酵素法ではCr+0.2で計算する方がよい)
 CBDCA dose(mg/body) = AUC x (Ccr +25)

Day 1

(/)

- ① 生食 100ml / ルートキープ
- ② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P
+ デキサート(6.6mg/2ml) 2V 30分でDiv
- Y ③ **ゲムシタビン()mg/body + 生食100ml 30分でDiv**
副作用増強のおそれがあるため60分以内で投与
- Y ④ **カルボプラチン()mg/body + 生食250ml 60分でDiv**
- ⑤ 生食 100ml 30分でDiv

Day 8

(/)

- ① 生食 100ml / ルートキープ
- ② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P
+ デキサート(6.6mg/2ml) 2V 30分でDiv
- Y ③ **ゲムシタビン()mg/body + 生食100ml 30分でDiv**
副作用増強のおそれがあるため60分以内で投与
- ⑤ 生食 100ml 30分でDiv