

非小細胞肺癌に対する

**シスプラチン + TS-1内服併用療法(5週毎)**

CDDP+S-1

コース目

シスプラチン(CDDP) 60mg/m<sup>2</sup> (Day8)

TS-1(S-1) 80mg/m<sup>2</sup>(Day1~21内服、1~2週休薬)

4~5週毎

身長 cm	体重 kg	体表面積 m <sup>2</sup>	Cr mg/dl
----------	----------	------------------------	-------------

TS-1(S-1)	BSA<1.25	20mg 4cp 2x(80mg/day)
	1.25≤BSA<1.5	25mg 4cp 2x(100mg/day)
	BSA≤1.5	20mg 6cp 2x(120mg/day)
80>Ccr≥60ml/minでは1段階減量、Ccr<60ml/minでは投与不可		

Ccr = 体重(kg) x (140-年齢) / 72x Cr(mg/dl)

女性は0.85倍

Cr(日本での酵素法ではCr+0.2で計算する方がよい)

Day1~Day21	TS-1 内服	Day22~Day28~Day35	休薬(TS-1中止)
------------	---------	-------------------	------------

Day2,3 | デカドロン錠(4mg) 1錠 朝食後内服

- Day 8
- ( / )
- ① 生食 100ml / ルートキープ
  - ② プロイメント注(150mg) 1V  
+ デキサート(6.6mg/2ml) 1V + 生食250ml 60分でDiv
  - ③ グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P 30分でDiv
  - ④ ソルデム3A 500ml + 硫酸Mg補正液(20mEq/20ml) 1A 60分でDiv
  - ⑤ 生食 500ml 60分でDiv
  - ⑤ マンニトール 300ml 30分でDiv
  - Y ⑥ シスプラチン ( )mg/body + 生食300ml 120分でDiv
  - ⑦ ソルデム3A 500ml 60分でDiv