

主治医

非小細胞肺癌に対する

ビノレルビン(ロゼウス) + ゲムシタビン併用療法

VNR+GEM コース目

ビノレルビン(VNR)	20~25mg/m <sup>2</sup> (Day1,8,15)	4週毎
ゲムシタビン(GEM)	800~1000mg/m <sup>2</sup> (Day1,8,15)	

身長	体重	体表面積
cm	kg	m <sup>2</sup>

Day 1  
( / )

- ① 生食 100ml / ルートキープ
- ② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P  
+ デキサート(6.6mg/2ml) 1V 30分でDiv
- Y ③ ビノレルビン( )mg/body + 生食50ml 10分でDiv
- ④ 生食 250ml 全開
- Y ⑤ ゲムシタビン( )mg/body + 生食100ml 30分でDiv  
副作用増強のおそれがあるため60分以内で投与
- ⑥ 生食 100ml 30分でDiv

Day 8  
( / )

- ① 生食 100ml / ルートキープ
- ② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P  
+ デキサート(6.6mg/2ml) 1V 30分でDiv
- Y ③ ビノレルビン( )mg/body + 生食50ml 10分でDiv
- ④ 生食 250ml 全開
- Y ⑤ ゲムシタビン( )mg/body + 生食100ml 30分でDiv  
副作用増強のおそれがあるため60分以内で投与
- ⑥ 生食 100ml 30分でDiv

Day 15

( / )

- ① 生食 100ml / ルートキープ
- ② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P  
+ デキサート(6.6mg/2ml) 1V 30分でDiv
- Y ③ 

ビノレルビン( )mg/body + 生食50ml 10分でDiv
-----------------------------------
- ④ 生食 250ml 全開
- Y ⑤ 

ゲムシタピン( )mg/body + 生食100ml 30分でDiv
副作用増強のおそれがあるため60分以内で投与
- ⑥ 生食 100ml 30分でDiv

2016年7月 文責 呼吸器内科