

非小細胞肺癌に対する

TS-1内服(S-1)単剤療法

S-1 コース目

身長 cm	体重 kg	体表面積 m ²	Cr mg/dl
----------	----------	------------------------	-------------

TS-1(S-1) 80mg/m²

- ①3週投与、1～2週休薬 →CDDP併用 regimen
- ②4週投与、2週休薬 →標準 regimen
- ③2週投与、1週休薬 →高齢者、PS不良例 regimen

TS-1(S-1)	BSA<1.25	20mg 4cp 2x(80mg/day)
	1.25≤BSA<1.5	25mg 4cp 2x(100mg/day)
	BSA≤1.5	20mg 6cp 2x(120mg/day)

80>Ccr≥60ml/minでは1段階減量、Ccr<60ml/minでは投与不可

Ccr = 体重(kg) x (140-年齢) / 72x Cr(mg/dl)

女性は0.85倍 Cr(日本での酵素法ではCr+0.2で計算する方がよい)

項目	適正使用基準	慎重投与	投与禁忌
PerformanceStatus(PS)	PS 0～2	PS 3	PS 4
ヘモグロビン	9.0g/dl以上	8.0～9.0g/dl未満	8.0g/dl未満
白血球数	3500/ul以上	2000～3500/ul未満	2000/ul未満
血小板数	10万/ul以上	7.5万～10万/ul未満	7.5万/ul未満
総ビリルビン	基準値の2倍以内	3mg/dl未満	3mg/dl以上
AST, ALT	基準値の2倍以内		基準値の2倍以上