

カルボプラチン + ペトレキセド(アリムタ)
+ ベバシズマブ(アバステン)併用療法

CBDCA+ALI+BEV コース目(標準6コース)

カルボプラチン(CBDCA) AUC 4~5~6 (Day1)
ペトレキセド(ALI) 375~500mg/m² (Day1)
ベバシズマブ(BEV) 7.5~15mg/kg(Day1)

3~4週毎

身長	cm	体重	kg	体表面積	m ²
----	----	----	----	------	----------------

$Ccr(\text{Cockcroft-Gault}) = \frac{\text{体重}(\text{kg}) \times (140 - \text{年齢})}{72 \times Cr(\text{mg/dl})}$
 女性は0.85倍 Cr(日本での酵素法ではCr+0.2で計算する方がよい)
 $\text{CBDCA dose}(\text{mg/body}) = \text{AUC} \times (Ccr + 25)$

投与7日 以上前~ | メチコパール注(500 μg) 1A 筋注
 パンピタン末 1g 1日1回内服

前日~ Day4 | デキサトロン(4mg) 1錠(2mg) 朝食後内服

Day 1
(/)

- ① メコパラミン注(500 μg) 1A 筋注
- ② 生理食塩液 100ml / ルートキープ
- ③ グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P
+ デキサート(6.6mg/2ml) 2V 30分でDiv

Y ④ ペトレキセド()mg/body + 生食100ml 10分でDiv

⑤ 生食 100ml 20分でDiv

Y ⑥ カルボプラチン()mg/body + 生食250ml 60分でDiv

Y ⑦ ベバシズマブ()mg/body + 生食100ml ※

※初回90分、2回目60分、以降30分でDiv

⑧ 生理食塩液 100ml 30分でDiv

2016年7月 文責 呼吸器内科・外科

※ 添付文書に記載されているVB12製剤の使用方法は、「初回投与少なくとも7日前に1mgを投与し、その後9週(3コース)毎に投与終了後22日目まで投与」となっているが、投与忘れがないよう、当院ではペトレキセド(アリムタ)投与ごとにVB12 500 μgをレジメンに登録している。