

扁平上皮がん

キイトルーダ(ペムプロリズマブ)+カルボプラチン+nab-PTX(アブラキサン)併用療法 3週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
ペムプロリズマブ (アルブミン懸濁型)	キイトルーダ	200mg/body	d1
nab-PTX	アブラキサン	100mg/m ²	d1,8,15
カルボプラチン	カルボプラチン	AUC=6	d1

Ccr(Cockcroft-Gault) = 体重(kg) x (140-年齢) / 72 x Cr(mg/dl)

女性は0.85倍

Cr(日本での酵素法ではCr+0.2で計算する方がよい)

CBDCA dose(mg/body) = AUC x (Ccr +25)

Day1	
①	生理食塩液 100ml / ルートキープ
②	グラニセトンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 2V /30min
Y ③	ペムプロリズマブ 200mg/body + 生食50ml / 30min 0.2~5μm以下のインラインフィルター付ルートを使用
④	生食 50ml / 全開フラッシュ
S ⑤	生理食塩液 100ml / ルートキープ ※別ルートを使用(インラインフィルター付ルートは使用しないで下さい。) ※以下全てバッグアダプタを使用
S ⑥	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)()mg/body + 生食50ml / 30min
S ⑦	生食 50ml / 全開フラッシュ
S ⑧	カルボプラチン()mg/body + 生食250ml / 60min
S ⑨	生食 100ml / 30min

day8,15	
①	生食 100ml / ルートキープ
②	グラニセトンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min
③	生理食塩液 50ml / 全開(フラッシュ)
Y ④	パクリタキセル(アルブミン懸濁型)()mg/body + 生食50ml / 30min
Y ⑤	生食 100ml / 30min Y字から投与, バッグアダプタ使用

Day1

