

# 進行非扁平上皮非小細胞癌

アテゾリズマブ(テセントリク)+カルボプラチン+nab-PTX(アブラキサン)併用療法  
(導入療法として4サイクル又は6サイクル行う) 3週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
アテゾリズマブ	テセントリク	1200mg/body	d1
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	nab-PTX アブラキサン	100mg/m <sup>2</sup>	d1,8,15
カルボプラチン	CBDCA カルボプラチン	AUC=6	d1

Ccr(Cockcroft-Gault) = 体重(kg) x (140-年齢) / 72 x Cr(mg/dl)

女性は0.85倍

Cr(日本での酵素法ではCr+0.2で計算する方がよい)

CBDCA dose(mg/body) = AUC x (Ccr +25)

Day1
① 生理食塩液 100ml / ルートキープ
② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 2V /30min
Y ③ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">アテゾリズマブ 1200mg/body + 生食250ml /※</span> 0.2または0.22 μ mのインラインフィルター付ルートを使用 ※初回は60分、忍容性が良好であれば2回目以降は30分でDiv
④ 生食 50ml / 全開フラッシュ
S ⑤ 生理食塩液 100ml / ルートキープ ※別ルートを使用(インラインフィルター付ルートは使用しないで下さい。) ※以下全てバッグアダプタを使用
S ⑥ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">パクリタキセル(アルブミン懸濁型)( )mg/body + 生食50ml / 30min</span>
S ⑦ 生食 50ml / 全開フラッシュ
S ⑧ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">カルボプラチン( )mg/body + 生食250ml / 60min</span>
S ⑨ 生食 100ml / フラッシュ用

day8,15
① 生食 100ml / ルートキープ
② グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min
③ 生理食塩液 50ml / 全開(フラッシュ)
Y ④ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">パクリタキセル(アルブミン懸濁型)( )mg/body + 生食50ml / 30min</span>
Y ⑤ 生食 100ml / フラッシュ用 Y字から投与, バッグアダプタ使用

Day1

