

再発非小細胞肺癌(扁平上皮がん)

ニボルマブ+イピリムマブ+カルボプラチン+パクリタキセル併用療法

※導入療法1コース(導入・維持療法併せて最長24か月)6週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日	
ニボルマブ	オプジーボ	360mg/body	d1、22	q3w
イピリムマブ	ヤーボイ	1mg/kg	d1	q6w
パクリタキセル / PTX	パクリタキセル	200mg/m ²	d1、22	
カルボプラチン / CBDCA	カルボプラチン	AUC=6	d1、22	

Ccr(Cockcroft-Gault) = 体重(kg) x (140-年齢) / 72x Cr(mg/dl)

女性は0.85倍

Cr(日本での酵素法ではCr+0.2で計算する方がよい)

CBDCA dose(mg/body) = AUC x (Ccr +25)

Day1	
①	生食 100ml / ルートキープ
②	アロキシ(0.75mg) 1V + デキサート(6.6mg/2ml) 2V + ポララミン(5mg) 1A + ファモチジン(20mg) 1A + 生食100ml/30分でDiv
Y③	ニボルマブ360mg/body + 生食50ml 30分でDiv 0.2または0.22 μ mのインラインフィルター付ルートを使用
④	生食 100ml / 30分 (フラッシュ用)
Y⑤	イピリムマブ()mg/body + 生食20ml 30分でDiv 0.2又は0.22μmのインラインフィルター付ルートを使用 ニボルマブ投与終了後、30分以上あけて、投与を開始すること 生食又は5%糖液を用いて、1~4mg/mlの濃度に希釈すること 1~4mg/ml確保のため、生食50ml→生食20mlにして使用
⑥	生食 100ml / (フラッシュ用)
Y⑦	パクリタキセル()mg/body + 生食500ml /180min インラインフィルター付ルート使用
Y⑧	カルボプラチン()mg/body + 生食250ml / 60min

Day22

- ① 生食 100ml / ルートキープ
- ② アロキシ(0.75mg) 1V + デキサート(6.6mg/2ml) 2V
+ ポラミン(5mg) 1A + ファモチジン(20mg) 1A + 生食100ml/30分でDiv
- Y③

ニボルマブ360mg/body + 生食50ml 30分でDiv

0.2または0.22 μ mのインラインフィルター付ルートを使用

- ④ 生食 100ml / (フラッシュ用)
- Y⑤

パクリタキセル()mg/body + 生食500ml /180min

インラインフィルター付ルート使用

- Y⑥

カルボプラチン()mg/body + 生食250ml / 60min
