

**アムルピシン(カルセド)単剤療法**

AMR コース目

**アムルピシン(AMR) 35~40~45mg/m<sup>2</sup>(Day1~3) 3~4週毎**

身長	体重	体表面積
cm	kg	m <sup>2</sup>

Day 1

( / )

① 生食 100ml / ルートキープ

② デキサート(6.6mg/2ml) 1V  
+ グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P 30分でDiv

Y ③ **アムルピシン( )mg/body + 生食50ml 全開**

ポンプ使用禁止、10分以内に投与終了

④ 生食50ml 全開

Day 2

( / )

① 生食 100ml / ルートキープ

② デキサート(6.6mg/2ml) 1V  
+ グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P 30分でDiv

Y ③ **アムルピシン( )mg/body + 生食50ml 全開**

ポンプ使用禁止、10分以内に投与終了

④ 生食50ml 全開

Day 3

( / )

① 生食 100ml / ルートキープ

② デキサート(6.6mg/2ml) 1V  
+ グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P 30分でDiv

Y ③ **アムルピシン( )mg/body + 生食50ml 全開**

ポンプ使用禁止、10分以内に投与終了

④ 生食50ml 全開