

## 進展型小細胞肺癌

### デュルバルマブ(イミフィンジ)+カルボプラチン+エトポシド併用療法

3週毎

※4コース目まで。以降デュルバルマブ単剤での維持療法

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
デュルバルマブ		イミフィンジ	1500mg/body 20mg/kg (体重30kg以下 の場合)	d1
エトポシド	VP-16	エトポシド	100mg/m <sup>2</sup>	d1,2,3
カルボプラチン	CBDCA	カルボプラチン	AUC=5~6	d1

Ccr(Cockcroft-Gault) = 体重(kg) x (140-年齢) / 72x Cr(mg/dl)

女性は0.85倍 Cr(日本での酵素法ではCr+0.2で計算する方がよい)

CBDCA dose(mg/body) = AUC x (Ccr +25)

Day1 イメンドカプセル(125) 1カプセル 抗がん剤投与1時間前に内服

Day2,3 イメンドカプセル(80) 1カプセル 朝食後内服

Day1

- ① 生理食塩液 100ml / ルートキープ
- ② グラニセトンバッグ(1mg/50ml) + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 30min
- ③ 生食 100ml /フラッシュ用

Y ④ デュルバルマブ 1500mg/body + 生食100ml / 60min  
0.2または0.22 μmのインラインフィルター付ルートを使用

⑤ 生食 100ml /フラッシュ用

Y ⑥ エトポシド( )mg/body + 生食500ml / 120min

Y ⑦ カルボプラチン( )mg/body + 生食250ml / 60min

Day2,3

- ① 生理食塩液 100ml / ルートキープ
- ② グラニセトンバッグ(1mg/50ml) / 30min

Y ③ エトポシド( )mg/body + 生食500ml / 120min

④ 生食 100ml /フラッシュ用