

頭頸部がん

CDDP+5FU 療法

3週毎

| 薬剤・略号 | | 商品名 | 投与量 | 投与日 |
|----------|------|--------|----------------------|--------|
| シスプラチン | CDDP | シスプラチン | 80mg/m ² | Day1 |
| フルオロウラシル | 5-FU | 5-FU | 800mg/m ² | Day1～4 |

Day0

ソリューゲンF 500ml / 6hr (10時～16時)

ソルデム3A 500ml/ 6hr (16時～22時)

ソリューゲンF 500ml / 6hr (22時～翌4時)

Day1

ソルデム3A 500ml/ 6hr (4時～10時)

別 ① ソルデム3A 500ml/ 12hr

別ルート使用①(10時～22時) 抗がん剤と同時投与

② プロイメンド(150mg) 1V + デキサート(6.6mg/2ml) 1.5A + 生理食塩液 250ml / 1hr

③ アロキシ(0.75mg) 1V + 生理食塩液 100ml / 30min

Y ④ シスプラチン()mg/body + 生理食塩液 300ml / 2hr

⑤ マンニトール 300ml / 1hr

Y ⑥ フルオロウラシル()mg/body + 生理食塩液 1000ml / 24hr 持続

別 ⑦ ソルデム3A 500ml/ 12hr

別ルート使用②(22時～翌10時) 抗がん剤と同時投与

Day2~4

- 別 ① ソルデム3A 500ml/ 12hr
別ルート使用①(10時~22時) 抗がん剤と同時投与
- ② デキサート(6.6mg/2ml) 1A + 生理食塩液 50ml / 15min
- Y ③ フルオロウラシル()mg/body + 生理食塩液 1000ml / 24hr 持続
- 別 ④ ソルデム3A 500ml/ 12hr
別ルート使用②(22時~翌10時) 抗がん剤と同時投与