

頭頸部がん

Cet+FP 療法

3週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
セツキシマブ	Cet	アービタックス	初回: 400mg/m ² 2回目以降: 250mg/m ²	Day1,8,15
シスプラチン	CDDP	シスプラチン	80/mg/m ²	Day1
フルオロウラシル	5-FU	5-FU	800mg/m ²	Day1~4

Day0

ソリューゲンF 500ml / 6hr (10時~16時)

ソルデム3A 500ml / 6hr (16時~22時)

ソリューゲンF 500ml / 6hr (22時~翌4時)

Day1

ソルデム3A 500ml / 6hr (4時~10時)

別 ① ソルデム3A 500ml / 12hr

別ルート使用①(10時~22時) 抗がん剤と同時投与

② プロイメド(150mg) 1V + デキサート(6.6mg/2ml) 1.5A + 生理食塩液 250ml / 1hr

③ ポララミン(5mg/1ml) 2A + アロキシ(0.75mg) 1V + 生理食塩水100ml / 30min

Y ④ セツキシマブ()mg/body + 生理食塩水 250ml / 初回は2時間で、2回目以降は1時間で投与する

⑤ 生理食塩液 100ml / 1hr (経過観察)

Y ⑥ シスプラチン()mg/body + 生理食塩液 300ml / 2hr

⑦ マンニトール 300ml / 1hr

Y ⑧ フルオロウラシル()mg/body + 生理食塩液 1000ml / 24hr 持続

別 ⑨ ソルデム3A 500ml / 12hr

別ルート使用②(22時~翌10時) 抗がん剤と同時投与

Day2~4

別 ① ソルデム3A 500ml / 12hr
別ルート使用①(10時~22時) 抗がん剤と同時投与

② デキサート(6.6mg/2ml) 1A + 生理食塩水50ml / 15min

Y ③ フルオロウラシル()mg/body + 生理食塩液 1000ml / 24hr 持続

別 ④ ソルデム3A 500ml / 12hr
別ルート使用②(22時~翌10時) 抗がん剤と同時投与

Day8,15

① 生理食塩液 100ml / ルートキープ

② ポララミン(5mg/1ml) 2A + デキサート(6.6mg/2ml) 1.5A + 生理食塩液 100ml / 30min

Y ③ セツキシマブ()mg/body + 生理食塩水 250ml / 1hr

④ 生理食塩液 100ml / 1hr (経過観察)