

頭頸部がん

TPF 療法

3週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日	
シスプラチン	CDDP	シスプラチン	70 mg/m ²	Day1
フルオロウラシル	5-FU	5-FU	700 mg/m ²	Day1~4
ドセタキセル	DOC	タキソテール	70 mg/m ²	Day1

Day0

ソリューゲンF 500ml / 6hr (10時~16時)

ソルデム3A 500ml / 6hr (16時~22時)

ソリューゲンF 500ml / 6hr (22時~翌日4時)

Day1

ソルデム3A 500ml/ 6hr (4時~10時)

別 ① ソルデム3A 500ml/ 12hr

別ルート使用①(10時~22時) 抗がん剤と同時投与

② プロイメンド注(150mg) 1V + デキサート(6.6mg/2ml) 1.5V
+ 生理食塩液 250ml / 60min

③ アロキシ(0.75mg) 1V + 生理食塩液 100ml / 30min

Y ④ ドセタキセル ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 1hr

Y ⑤ シスプラチン ()mg + 生理食塩液 300ml / 3hr

⑥ マンニトール 300ml / 1hr

Y ⑦ フルオロウラシル ()mg/body + 生理食塩液 1000ml / 24hr 持続

別 ⑧ ソルデム3A 500ml / 12hr

別ルート使用②(22時~翌10時) 抗がん剤と同時投与

Day2~4

別 ① ソルデム3A 500ml/ 12hr

別ルート使用①(10時~22時) 抗がん剤と同時投与

② デキサート(6.6mg/2ml) 1V + 生理食塩液 50ml / 15min

Y ③ フルオロウラシル ()mg/body + 生理食塩液 1000ml / 24hr 持続

別 ④ ソルデム3A 500ml / 12hr

別ルート使用②(22時~翌10時) 抗がん剤と同時投与