

# クローン病・潰瘍性大腸炎

## レミケード療法

2回目 初回から2週後 **検査値チェック不要**  
3回目 初回から6週後  
以降 8週毎 ※1

薬剤	商品名	投与量	投与日
インフリキシマブ	レミケード	5mg/kg	Day1
		10mg/kg ※2	Day1
		5mg/kg ※3	Day1

Day1

生理食塩液 100ml / ルートキープ

インフリキシマブ ( )mg/body + **生理食塩液 250ml** / 2hr以上

1.2  $\mu$  以下のインラインフィルター付ルートを使用

※1 クローン病のみ初回から6週後(3回目)の投与後、効果不十分又は効果が減弱した:  
増量や投与期間の短縮が可能。なお、最短の投与間隔は4週とする。

※2 増量の場合、10mg/kg 8週毎(クローン病のみ)

※3 投与期間短縮の場合、5mg/kg 最短4週毎(クローン病のみ)

### 調製方法

- 1) 21Gの注射針を用いて、1バイアルあたり生理食塩液10mlを、静かに注入する。
- 2) バイアルを回転させながら緩やかに溶解し、溶解後は5分間静置する。
- 3) 必要量をバイアルから抜き取り、約250mlの生理食塩液に希釈する。