

# 大腸がん

## FOLFIRI療法

2週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
イリノテカン	CPT-11	イリノテカン	180 mg/m <sup>2</sup>	Day1
レボホリナート	I-LV	レボホリナート	200 mg/m <sup>2</sup>	Day1
フルオロウラシル	5-FU(急速静注)	5-FU	400 mg/m <sup>2</sup>	Day1
	5-FU(持続点滴)		2400 mg/m <sup>2</sup>	

Day1

生理食塩液 100ml / ルートキープ

グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 30min

または

アロキシ(0.75mg) 1V + デキサート(6.6mg/2ml) 1V + 生理食塩液 100ml / 30min

【外来→アロキシ 入院→グラニセトロン】

レボホリナート ( )mg/body + 5%ブドウ糖液 250ml / 2hr

イリノテカンと同時に

イリノテカン ( )mg/body + 5%ブドウ糖液 250ml / 2hr

レボホリナートと同時に

フルオロウラシル ( )mg/body + 生理食塩液 50ml / 15min

フルオロウラシル ( )mg/body  
+ 生理食塩液 250ml または 500ml / 46hr ※

※) 外来はインフューザーポンプ使用ため、生理食塩液は250mlを選択する。  
入院は500mlの輸液バッグで投与する。