

大腸がん

セツキシマブ+XELOX療法

3週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
セツキシマブ Cet	アービタックス	初回: 400mg/m ² 2回目以降: 250mg/m ²	Day1,8,15
オキサリプラチン L-OHP	エルプラット	130mg/m ²	Day1
カペシタビン	ゼローダ	1回1000mg/m ² 1日2回	1日目午後～ 15日目午前

Day1

- ① 生理食塩液 100ml / ルートキーブ
- ② ポララミン(5mg/1ml) 2A + デキサート(6.6mg/2ml) 1A
+ アロキシ(0.75mg) 1V + 生理食塩液 100ml / 30min

Y ③ セツキシマブ ()mg/body + 生理食塩液 250ml / ※1

- ④ 生理食塩液 100ml / 60min (経過観察)※2

Y ⑤ オキサリプラチン ()mg/body + **5%ブドウ糖液 500ml** / 2hr

- ⑥ 生理食塩液 100ml / フラッシュ (入院のみ)

内服 ゼローダ ()mg/body 2×朝夕食後 14日分(1日目午後～15日目午前)

体表面積	ゼローダ1回用量
<1.36m ²	1,200mg(4錠)
1.36m ² ≤ ~ <1.66m ²	1,500mg(5錠)
1.66m ² ≤ ~ <1.96m ²	1,800mg(6錠)
1.96m ² ≤	2,100mg(7錠)

Day8,15

- ① 生理食塩液 100ml / ルートキーブ
- ② ポララミン(5mg/1ml) 2A + デキサート(6.6mg/2ml) 1A
+ 生理食塩液 100ml / 30min

Y ③ セツキシマブ ()mg/body + 生理食塩液 250ml / ※1

- ④ 生理食塩液 100ml / 60min (経過観察)※2

※1 セツキシマブ(アービタックス)は初回は2時間で、2回目以降は1時間で投与する。

※2 投与後の観察時間は認容性に問題が無ければ、2回目以降30分に短縮可とする。