

大腸がん

XELOX+ベバシズマブ療法

3週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
ベバシズマブ	Avastin アバステン	7.5mg/kg	Day1
オキサリプラチン	L-OHP エルプラット	130mg/m ²	Day1
カペシタビン	ゼローダ	1回1000mg/m ² 1日2回	1日目午後～ 15日目午前

Day1

生理食塩液 100ml / ルートキープ

グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P + デキサート(6.6mg/2ml) 1V / 30min

または

アロキシ(0.75mg) 1V + デキサート(6.6mg/2ml) 1V + 生理食塩液 100ml/ 30min

【外来→アロキシ 入院→グラニセトロン】

ベバシズマブ ()mg/body + **生理食塩液 100ml / ※**

生理食塩液 50ml / 全開(フラッシュ)

オキサリプラチン ()mg/body + **5%ブドウ糖液 500ml / 2hr**

内服 ゼローダ ()mg/body 2×朝夕食後 14日分(1日目午後～15日目午前)

体表面積	ゼローダ1回用量
<1.36m ²	1,200mg(4錠)
1.36m ² ≤ ~ <1.66m ²	1,500mg(5錠)
1.66m ² ≤ ~ <1.96m ²	1,800mg(6錠)
1.96m ² ≤	2,100mg(7錠)

※ベバシズマブ(アバステン)の投与時間は初回は90分で行い、以後特に問題がなければ2回目は60分、3回目以降は30分で投与できる。