

胃がん

nab-PTX weekly(100)療法

4週毎

薬剤・略号等	商品名	投与量	投与日
パクリタキセル (アルブミン懸濁型)	アブラキサン	100 mg/m ²	Day1,8,15

Day1

生理食塩液 100ml / ルートキープ

アロキシ(0.75mg) 1V + デキサート(6.6mg/2ml) 1V + 生理食塩液 100ml / 30min

生理食塩液 50ml / 全開(フラッシュ)

アブラキサン ()mg/body + **生理食塩液** 100ml / 30min

インラインフィルターは使用しないで下さい！！

調製方法

※1バイアルあたり生理食塩液20mlが必要。

- 1)1バイアルあたり生理食塩液20mlを、バイアルの内壁伝いに、直接内容物にかけないよう泡立ちに注意しながらゆっくりと注入する。
- 2)内容物が確実に濡れるよう5分間以上バイアルを静置する。
- 3)生理食塩液のバッグから残液を廃棄し、空のバッグを作る。
- 4)内容物が十分に濡れたら、均一な白色ないし黄色の懸濁液になるまで、泡立たないよう混和する。
- 5)必要量をバイアルから抜き取り、3)で用意した空のバッグにゆっくりと注入する。

※パクリタキセル(アルブミン懸濁型)は特定生物由来製品です。そのため、「輸血用血液製剤及び血漿分画製剤使用承諾書(特定生物由来製品使用承諾書)」による患者の承諾が必要です。