

主治医

胃がん

TS-1/CDDP(CDDP 60/TS-1 80)

シスプラチン(CDDP) 60mg/m² (Day8)TS-1(S-1) 80mg/m²(Day1~21内服、1~2週休薬) 4~5週毎

身長	体重	体表面積	Cr
cm	kg	m ²	mg/dl

TS-1(S-1)	BSA<1.25	20mg 4cp 2x(80mg/day)
	1.25≤BSA<1.5	25mg 4cp 2x(100mg/day)
	BSA≤1.5	20mg 6cp 2x(120mg/day)
80>Ccr≥60ml/minでは1段階減量、Ccr<60ml/minでは投与不可		
Ccr = 体重(kg) × (140-年齢) / 72 × Cr(mg/dl)		
女性は0.85倍 Cr(日本での酵素法ではCr+0.2で計算する方がよい)		

Day1~Day21	TS-1 内服	Day22~Day28~Day35	休薬(TS-1中止)
------------	---------	-------------------	------------

前日~Day 8 ソルデム1 500ml x1 Div 化学療法終了時までkeep Main

Day8 イメドカプセル(125) 1カプセル 抗がん剤投与1時間~1時間30分前に内服
Day9,10 イメドカプセル(80) 1カプセル 朝食後内服Day 8 8時00分 ソリューゲンF 500ml 側管
(/) + テルペラン(10mg) 1A 90分でDiv9時30分 グラニセトロン(1mg) 1A + デキサート(6.6mg/2ml) 1V 側管
+ 生食 100ml 30分でDiv

10時00分 生食 500ml + メイロン7%(20ml) 1A 90分でDiv 側管

11時30分 ソリューゲンF 500ml 側管
+ テルペラン(10mg) 1A 90分でDiv

13時00分 シスプラチン ()mg/body + 生食300ml 120分でDiv 側管

15時00分 生食 500ml + メイロン7%(20ml) 1A 90分でDiv 側管

16時30分 ソリューゲンF 500ml 側管
+ ラシックス(20mg) 0.5A 90分でDiv

18時00分 マンニトール 300ml 30分でDiv 側管

18時30分 ソリューゲンF 500ml 側管
+ テルペラン(10mg) 1A 90分でDiv

(Main 残破棄、ヘパロック)

Day
9,10

(/)

9時30分 デキサート(6.6mg/2ml) 0.5V

Main

+ 生食 100ml 30分でDiv

10時00分 ソリューゲンF 500ml 120分でDiv

Main

12時00分 生食 500ml + メイロン7%(20ml) 1A 120分でDiv

Main

14時00分 マンニトール 200ml 30分でDiv

Main

14時30分 ソリューゲンF 500ml 120分でDiv

Main

16時30分 終了 (ヘパロック)

Main