

HER2陰性の切除不能な進行・再発胃がん(一次治療)

SOX+Nivo

3週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
ニボルマブ	Nivo	オプジーボ	360mg/body	Day1
オキサリプラチン	L-OHP	エルプラット	130mg/m ²	Day1
TS-1		TS-1	1日80mg/m ² 1日2回に分けて	1日目夕～ 15日目朝

Day1

生理食塩液 100ml / プライミング

アロキシ(0.75mg) 1V + デキサート(6.6mg/2ml) 1V + 生理食塩液 50ml / 15min

生理食塩液 100ml / フラッシュ

ニボルマブ360mg/body + 生食50ml / 30min

0.2または0.22 μ mのインラインフィルター付ルートを使用

生理食塩液 100ml / 観察時間30min

オキサリプラチン ()mg/body + **5%ブドウ糖液 250ml** / 2hr

内服 TS-1 ()mg/body 2×朝夕食後 14日分(1日目夕～15日目朝)

体表面積	TS-1 用量
<1.25m ²	80mg/day (40mg/回 × 2/day)
1.25m ² ≤ ~ <1.5m ²	100mg/day (50mg/回 × 2/day)
1.5m ² ≤	120mg/day (60mg/回 × 2/day)