

HER2陰性の切除不能な進行・再発胃がん(一次治療)

XELOX+Nivo

3週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
ニボルマブ	Nivo	オプジーボ	360mg/body	Day1
オキサリプラチン	L-OHP	エルプラット	130mg/m ²	Day1
カペシタビン	Cape	ゼローダ	1回1000mg/m ² 1日2回	1日目午後～ 15日目午前

Day1

生理食塩液 100ml / プライミング

アロキシ(0.75mg) 1V + デキサート(6.6mg/2ml) 1V + 生理食塩液 50ml / 15min

生理食塩液 100ml / フラッシュ

ニボルマブ360mg/body + 生食50ml / 30min

0.2または0.22 μ mのインラインフィルター付ルートを使用

生理食塩液 100ml / 観察時間30min

オキサリプラチン ()mg/body + **5%ブドウ糖液 500ml** / 2hr

内服 ゼローダ ()mg/body 2×朝夕食後 14日分(1日目午後～15日目午前)

体表面積	ゼローダ1回用量
<1.36m ²	1,200mg(4錠)
1.36m ² ≤ ~ <1.66m ²	1,500mg(5錠)
1.66m ² ≤ ~ <1.96m ²	1,800mg(6錠)
1.96m ² ≤	2,100mg(7錠)