

HER2陰性の切除不能な進行・再発の胃がん(一次治療)

FOLFOX+Nivo療法

2週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
ニボルマブ	Nivo	オプジーボ	240 mg/body	Day1
オキサリプラチン	L-OHP	エルプラット	85 mg/m ²	Day1
レボホリナート	I-LV	レボホリナート	200 mg/m ²	Day1
フルオロウラシル	5-FU(Bolus)	5-FU	400 mg/m ²	Day1
	5-FU(Infusion)		2400 mg/m ²	Day1

※必要に応じてアプレピタントカプセル使用

Day1

① 生理食塩液 100ml / プライミング用

② パロノセトロン(0.75mg) 1V + デカドロン(6.6mg/2ml) 1V + 生理食塩液 50ml/ 15min

③ 生理食塩液 100ml / フラッシュ

Y④ ニボルマブ240mg/body + 生食50ml / 30min

0.2または0.22 μ mのインラインフィルター付ルートを使用

⑤ 生理食塩液 100ml / 観察時間30min

S⑥ 生理食塩液 100ml / Sルートプライミング用

S⑦ レボホリナート ()mg/body + 5%ブドウ糖液 250ml / 2hr

オキサリプラチンと同時に

Y⑧ オキサリプラチン ()mg/body + 5%ブドウ糖液 250ml / 2hr

レボホリナートと同時に

Y⑨ フルオロウラシル ()mg/body + 生理食塩液 50ml / 15min

Y⑩ フルオロウラシル ()mg/body

+ 生理食塩液 250ml または 500ml / 46hr

※ 外来はインフューザーポンプ使用ため、生理食塩液は250mlを選択する。

生理食塩シリンジ 10ml/ インフューザー抜針用(外来)

生理食塩液 100ml / フルオロウラシル46時間投与後のフラッシュ用(入院)