

# 食道がん

**FP(CDDP 70/5-FU 700)療法 プロイメンド入り** 3週毎※

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
シスプラチン	CDDP	シスプラチン	70 mg/m <sup>2</sup>	Day1
フルオロウラシル	5-FU	5-FU	700 mg/m <sup>2</sup>	Day1~5

Day1

- ① ソルデム3A 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 90min
- ② 生理食塩液 500ml + メイロン(7%20ml) 1A / 90min
- ③ プロイメンド(150mg) 1V + デキサート(6.6mg/2ml) 1.5V  
+ 生理食塩液 250ml / 60min
- ④ グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min

Y ⑤ シスプラチン ( )mg + **生理食塩液 300ml** / 2hr

生理食塩液 50ml / シングルルートプライミング用(一般注射で入力)

S ⑥ フルオロウラシル ( )mg/body + 生理食塩液 500ml / 24hr 持続

- ⑦ 生理食塩液 500ml + メイロン(7%20ml) 1A / 90min
- ⑧ ソルデム3A 500ml + ラシックス(2mg/1ml) 1A / 90min
- ⑨ グラニセトロンバッグ(1mg/50ml) 1P / 30min
- ⑩ マンニトール 300ml / 30min
- ⑪ ソルデム3A 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 90min

Day2,3

- ① デキサート(6.6mg/2ml) 1V + 生理食塩液 100ml / 30min

Y ② フルオロウラシル ( )mg/body + 生理食塩液 500ml / 24hr 持続

- ③ ソルデム3A 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 90min
- ④ 生理食塩液 500ml + メイロン(7%20ml) 1A / 90min
- ⑤ マンニトール 300ml / 30min
- ⑥ ソルデム3A 500ml + テルペラン(10mg/2ml) 1A / 90min

Day4,5

Y フルオロウラシル ( )mg/body + 生理食塩液 500ml / 24hr 持続

※) 化学療法単独の場合は3週毎、化学放射線療法の場合は4週毎とする。