

膵がん

FOLFIRINOX療法

2週毎

薬剤・略号	商品名	投与量	投与日
オキサリプラチン L-OHP	エルプラット	85 mg/m ²	Day1
イリノテカン CPT-11	イリノテカン	180 mg/m ²	Day1
レボホリナート I-LV	レボホリナート	200 mg/m ²	Day1
フルオロウラシル 5-FU(急速静注)	5-FU	400 mg/m ²	Day1
		2400 mg/m ²	Day1

Day1 | イメンドカプセル(125) 1C 1× オキサリプラチン投与60~90分前に内服

Day2,3 | イメンドカプセル(80) 1C 1× 朝食後

Day2~4 | デカドロン錠(4mg) 2T 2× 朝昼食後

Day1

① 生理食塩液 100ml / ルートキープ

② アロキシ(0.75mg) 1V + デキサート(6.6mg/2ml) 1.5V + 生理食塩液 100ml / 30min

Y ③ **オキサリプラチン ()mg/body + 5%ブドウ糖液 250ml / 2hr**

④ 生理食塩液 100ml / シングルルートプライミング用

S ⑤ **レボホリナート ()mg/body + 5%ブドウ糖液 250ml / 2hr**

イリノテカンと同時に
シングルルート使用

Y ⑥ **イリノテカン ()mg/body + 5%ブドウ糖液 250ml / 2hr**

レボホリナートと同時に

Y ⑦ **フルオロウラシル ()mg/body + 生理食塩液 50ml / 15min**

Y ⑧ **フルオロウラシル ()mg/body
+ 生理食塩液 250ml または 500ml / 46hr ※**

生理食塩液 20ml(救急カート用シリンジ)

/ インフューザーポンプ抜針用(外来・オーダー入力は当日に)

生理食塩液 100ml / フルオロウラシル46時間投与後のフラッシュ用(入院)

※) 外来はインフューザーポンプ使用ため、生理食塩液は250mlを選択する。
入院は500mlの輸液バッグで投与する。