

乳がん

GEM+3wHER療法

3週毎

薬剤・略号等		商品名	投与量	投与日
ゲムシタビン	GEM	ゲムシタビン	1250mg/m ²	Day1,8
トラスツズマブ	Herceptin	ハーセプチン	初回; 8mg/kg 2回目以降; 6mg/kg	Day1 (Day22,43···)

Day1

- ① 生理食塩液 100ml / ルートキープ
- ② グラニセトロン(1mg/50ml) 1P / 30min
- Y ③ トラスツズマブ ()mg/body + 生理食塩液 250ml / 90min (初回)
トラスツズマブ ()mg/body + 生理食塩液 100ml / 30min
(2回目以降)※
- Y ④ 生理食塩液 50ml / 全開(フラッシュ)
Y字から投与, バッグアダプタ使用
- Y ⑤ ゲムシタビン ()mg/body + 生理食塩液 100ml / 30min
副作用増強の恐れがあるため60分以内で投与

Day8

- ① 生理食塩液 100ml / ルートキープ
- ② グラニセトロン(1mg/50ml) 1P / 30min
- Y ③ ゲムシタビン ()mg/body + 生理食塩液 100ml / 30min
副作用増強の恐れがあるため60分以内で投与

※ 初回投与時の忍容性が良好であれば、投与時間を30分まで短縮可。