

PD-L1陽性のトリプルネガティブ乳癌

キイトルーダ(ペムブロリズマブ)+ゲムシタビン+カルボプラチン併用療法

3週毎

薬剤・略号		商品名	投与量	投与日
ペムブロリズマブ	Pemb	キイトルーダ	200mg/body	d1
ゲムシタビン	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m ²	d1,d8
カルボプラチン	CBDCA	カルボプラチン	AUC=2	d1,d8

Ccr(Cockcroft-Gault) = 体重(kg) x (140-年齢) / 72 x Cr(mg/dl)

女性は0.85倍

Cr(日本での酵素法ではCr+0.2で計算する方がよい)

CBDCA dose(mg/body) = AUC x (Ccr +25)

d1,d8	アプレピタントカプセル(125) 1カプセル	CBDCA投与1時間~1時間30分前に内服
d2-3	アプレピタントカプセル(80) 1カプセル 朝食後内服	
d9-10		

※アプレピタントは必要に応じて使用を考慮する。

Day1	① 生理食塩液 100ml / ルートキープ
	② アロキシ(0.75mg) 1V + デキサート(6.6mg/2ml) 1V + 生理食塩液 50ml / 15min
	③ 生食 100ml / フラッシュ用
Y④	ペムブロリズマブ 200mg/body + 生食50ml / 30min 0.2~5μm以下のインラインフィルター付ルートを使用
	⑤ 生食 100ml / フラッシュ用
Y⑥	ゲムシタビン()mg/body + 生食100ml /30min 副作用増強のおそれがあるため60分以内で投与
Y⑦	カルボプラチン()mg/body + 生食250ml / 60min

Day8	① 生理食塩液 100ml / ルートキープ
	② アロキシ(0.75mg) 1V + デキサート(6.6mg/2ml) 1V + 生理食塩液 50ml / 15min
Y③	ゲムシタビン()mg/body + 生食100ml /30min 副作用増強のおそれがあるため60分以内で投与
Y④	カルボプラチン()mg/body + 生食250ml / 60min